

MEMO Nº 07

Teresina, 20 de março de 2020.

Da: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Diretoria Geral, Diretoria Técnica e Áreas Assistenciais do HGV

Em função da urgência e necessidade de adoção de medidas para controle da disseminação do novo coronavírus (SARS – Cov 2), considerado Agente Biológico da Classe de Risco Nível 3 e diante da necessidade de proteção dos nossos profissionais de saúde segue as recomendações sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para os profissionais que estejam diante de um paciente com **suspeita** ou **confirmação** da COVID-19. Ressaltamos que as medidas de precaução deverão ser de contato e respiratório, enfatizando que a Higienização das Mãos nos 05 (cinco) momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde – OMS se faz estritamente necessária antes e após a retirada destes EPIs.

1. As máscaras cirúrgicas deverão ser utilizadas em todos os momentos assistenciais destes pacientes junto com os protetores faciais, luvas de procedimento, touca e capotes impermeáveis; O uso correto destas máscaras é fundamental, deverá cobrir nariz e boca, com descarte ao observar a máscara úmida ou a cada 04 horas;
2. Os respiradores N95 ou PFF2 deverão ser utilizados em todos os procedimentos de vias áreas geradores de aerossóis como: entubação e aspiração traqueal, ventilação não invasiva, manobras de ressuscitação cardiopulmonar, coletas de amostras nasotraqueais e nasofaringeas e broncoscopia. O uso destes respiradores dependerá da forma de acondicionamento e estado de preservação, com indicação de uso de 15 dias seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
3. Os respiradores N95 ou PFF2 deverão ser utilizados de forma individualizada, identificada por profissional, acondicionada em um saco plástico vedado, sugerindo-se que permaneça na instituição para uso exclusivo da assistência;
4. Os profissionais deverão utilizar além dos EPIs, vestuário adequado e sapatos fechados para uma proteção maior;
5. Teremos dois modelos kits de EPIs que serão disponibilizados para os profissionais da assistência aos pacientes suspeitos e confirmados.



FEPISERH
Fundação Estatal Piauiense
de Serviços Hospitalares

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS



- **Kit 01:** Protetor facial + máscaras descartável+ avental impermeável + touca descartável – Deverá ser utilizado aos cuidados que não serão gerados aerossóis e descartado local adequado e de forma correta para evitar contaminação;
 - **Kit 02:** Protetor facial ou óculos protetores + máscaras N 95 + avental impermeável + touca descartável
6. Para pacientes com sintomas respiratórios agudos deverão utilizar máscaras cirúrgicas e obedecidas as orientações de isolamento e distanciamento.

Atenciosamente,

Coordenador da Comissão de Controle Infecção Hospitalar

Francisco Eugênio Deusdará de Alexandria